

|  | Recolección del Huevo   | Fumigación  | Almacenamiento del Huevo  | Transporte  |   |                  |  |   |          |           |                     |           |               |  |
|--|---|---|---|---|---|------------------|--|---|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------|--|
| Higiene del Huevo  | <p>El riesgo de contaminación es más alto en los primeros 3 minutos post oviposición</p>  | <p>Fumigar con formaldehído dentro de 2 horas posteriores a la recolección</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Calentar 10 gramos (0.4 oz) de gránulos de paraformaldehído ó 43 ml (1.45 oz fluidas) de formalina (37,5%) y 21 gr (0.74 oz) permanganato de potasio por m<sup>3</sup> (35 pies<sup>3</sup>) de espacio</li> <li>Temperatura mínima 24 °C (75 °F) con 65% de HR</li> <li>Hacer funcionar ventiladores de circulación para asegurar una distribución uniforme</li> <li>Siempre cumplir con la legislación local</li> </ul> | <p>Mantener los huevos secos, asegurar que los enfriadores y humidificadores estén limpios y bien mantenidos para evitar goteo de agua e impedir corrientes de aire directamente sobre los huevos</p>   | <p>Evitar la condensación: mantener la cadena de frío entre la sala del huevo y el transporte</p> |   |                  |  |   |          |           |                     |           |               |  |
|  | <p>Mantener limpios los nidos; remover diariamente el material sucio y heces. Limpiar/sanitizar cada semana las correas mecánicas</p> |   |   |   | <p>Recolectar separadamente los huevos sucios y de piso de los huevos limpios y mantenerlos separados</p> |                  | <p>Limpiar y desinfectar la sala de almacenamiento de huevos después de vaciarla</p> | <p>Verificar que el camión de transporte de huevos haya sido limpiado y desinfectado antes de cargar los huevos</p> |          |           |                     |           |               |  |
| Manejo del Huevo   | <p>Los huevos deben ser recolectados como mínimo 4 veces al día</p>   | <p>Usar bandejas plásticas para la fumigación</p>   | <p>Almacenar los huevos dentro de 4 horas desde la recolección</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Edad del huevo</th> <th>Temperatura de Almacenamiento</th> <th>Humedad Relativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-7 Días</td> <td>18 °C (64 °F)</td> <td rowspan="3">75 - 80%</td> </tr> <tr> <td>8-13 Días</td> <td>12-15 °C (54-59 °F)</td> </tr> <tr> <td>&gt; 13 Días</td> <td>12 °C (54 °F)</td> </tr> </tbody> </table> | Edad del huevo  | Temperatura de Almacenamiento   | Humedad Relativa | 0-7 Días   | 18 °C (64 °F)   | 75 - 80% | 8-13 Días | 12-15 °C (54-59 °F) | > 13 Días | 12 °C (54 °F) | <p>Manejar los huevos cuidadosamente durante el traslado desde la sala hasta el camión de transporte para evitar daños</p> |
|  | Edad del huevo  | Temperatura de Almacenamiento   | Humedad Relativa  |   |   |                  |  |   |          |           |                     |           |               |  |
| 0-7 Días   | 18 °C (64 °F)   | 75 - 80%  |   |   |   |                  |  |   |          |           |                     |           |               |  |
| 8-13 Días  | 12-15 °C (54-59 °F)   |   |   |   |   |                  |  |   |          |           |                     |           |               |  |
| > 13 Días  | 12 °C (54 °F)   |   |   |   |   |                  |  |   |          |           |                     |           |               |  |
| <p>Manejar cuidadosamente los huevos para evitar trizaduras durante la recolección</p> | <p>Enfriar los huevos bajo cero fisiológico (24 °C/75 °F) antes de empacarlos en cajas</p>  | <p>llenar los carros desde abajo hacia arriba</p>   |   |   |   |                  |  |   |          |           |                     |           |               |  |